

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 140 F Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 000 28 D



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 12 - 6 mai 1987

COLZACharançon des siliques : *Ne traiter que si présence d'insectes*Maladies : floraison depuis 22/4 : *elles doivent être protégées*floraison depuis 29/4 : *traiter avant le 8/5*floraison début : *traiter avant le 13-15/5*BLE : *Première intervention pour les situations les plus tardives*ORGES D'HIVER : *Seconde intervention dès que le stade sortie des barbes est atteint***C O L Z A**

Pour l'Yonne et la Nièvre, ces informations sont diffusées également dans le cadre du CLUB COLZA SOPRA.

L'évolution de la situation s'est poursuivie. Les stades s'étalent entre G3 (situations de plaine) au stade F1 (situations de plateaux ou tardives).

CHARANCONS DES SILIQUES

- Présence irrégulière, le plus souvent faible, selon les parcelles.
- Surveiller et n'intervenir que si le seuil de 1 charançon/plante est atteint.

MALADIES DU COLZA**SITUATION CYLINDROSPORIOSE ET PSEUDOCERCOSPORELLA :**

- Jusqu'à la fin de la semaine dernière peu d'évolution depuis le bulletin précédent.
- La situation pluvieuse qui s'est installée depuis quelques jours va permettre la progression des symptômes sur les feuilles supérieures.

PRECONISATIONS :

Pour le choix du ou des produits, selon le risque maladie se reporter au bulletin n° 10 du 23 avril.

- Situations en avance : au début floraison vers le 22/04 : Elles doivent déjà être protégées actuellement.
- Situations intermédiaires : au début floraison vers le 29/04 : La préconisation du bulletin précédent reste valable, réaliser un traitement avant le 8/05 environ ; si elles ne sont pas encore protégées, le faire dès que possible.
- Situations en retard : au début floraison vers le 5/05 - des applications sont à prévoir avant le 13-15/05 environ.

F.25

B L E

Evolution de la végétation ralentie.

Stade 7 généralement atteint en plateaux et secteurs tardifs.

Stade 8, parfois 8-9 atteint dans les autres secteurs. Les semis tardifs atteignent en plaine le stade 7.

— MALADIES DU PIED

Piétin verse : L'importance des attaques et la fréquence des parcelles touchées évoluent peu restant dans l'ensemble modérées avec des attaques locales très sensibles. Le passage des attaques sur tige est observé.

— MALADIES DU FEUILLAGE

Septoriose en légère progression en tous secteurs.

PRECONISATION :

Situations non encore protégées :

Protection à prévoir prochainement.

En l'absence ou avec un faible niveau de piétin verse, le traitement visant surtout la septoriose pourra, en présence de faibles attaques, être différé jusqu'au début du passage sur F3.

Situations déjà protégées :

L'évolution de la septoriose reste à surveiller, en particulier en cas de premier traitement précoce.

ORGES D'HIVER

Evolution de la végétation ralentie également.

En plateaux ou secteurs tardifs, stade 8 à 9 généralement observé.

Dans les autres secteurs, stade 9 à 10, sortie des barbes assez fréquente en plaine.

— MALADIES DU FEUILLAGE

Rhynchosporiose : sans marquer de progression très sensible, reste la maladie la plus fréquente, assez souvent observée sur F3, plus rarement sur F2.

Helminthosporiose : moins fréquente, mais en progression dans les parcelles touchées, atteignant localement le niveau F2.

PRECONISATION :

Compte tenu des contaminations possibles lors de la période pluvieuse traversée et de la baisse d'efficacité des traitements après l'épiaison, les parcelles atteignant le stade "sortie des barbes" sont à protéger dès que possible.

*

*

*